



INTOXICACION POR MEDICAMENTOS COMO FORMA DE INTENTO DE SUICIDIO

Ortiz P, Inostroza T, Cáceres J, Mulet A, Von Dessauer B
Unidad de Paciente Crítico (UPC) - Hospital Roberto del Río

INTRODUCCION

Las Intoxicaciones corresponden al 7% de las consultas en los servicios de urgencia. En lactantes y preescolares la causa es accidental, mientras que en adolescentes es secundario a Intento suicida.

OBJETIVO

Caracterizar a los pacientes ingresados por a UCP del Hospital Roberto del Río desde Enero 2005 a Noviembre de 2007 con diagnóstico de Intoxicación medicamentosa como forma de intento de suicidio

MATERIAL Y MÉTODO


Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, mediante análisis de fichas clínicas de todos los casos de intoxicación o ingesta medicamentosa durante el período previamente descrito

RESULTADOS


Se analizaron 111 casos, que significan un 4% de los egresos de la unidad, de los cuales 32% corresponde a Intoxicaciones accidentales, 66% a Intento de suicidio y 2% a intentos de parricidio. Los pacientes ingresados por Intento de suicidio presentan un rango de edad entre 7 y 16 años, con un promedio de 13 años. El 90 % de los pacientes analizados corresponde a sexo femenino. El total de casos se distribuye un 23% durante el 2005, 29% el 2006 y 48% el 2007. Se presentan en distribución anual bimodal concentrándose en los meses de Abril - Mayo (Otoño) 32% y Octubre-Noviembre (Primavera) 34% para el total de casos.

Con respecto a la ingesta medicamentosa, un 42% de los pacientes utilizó polifarmacia, destacando los antidepresivos tricíclicos y entre ellos la Amitriptilina, relacionado con un 30% de los casos. El promedio de estada en UPC fue de 1,3 días. El 19% (14) de los pacientes requirió apoyo con ventilación mecánica, por depresión transitoria del SNC. El 27% de los ingresos tenía antecedente de intento suicidio previo, además de comorbilidad psicosocial, destacando 57% disfunción familiar, 28% depresión severa, 12% consumo de drogas, 10% violencia intrafamiliar, 10% abuso sexual, 8% deserción escolar, 4% bullying. El 92% de los pacientes fue evaluado por el equipo de salud mental previo al alta hospitalaria y en un 66% se constató control ambulatorio. En esta serie la mortalidad fue 0%.

INCIDENCIA POR AÑO



DISTRIBUCIÓN ANUAL



CONCLUSIONES

- El Intento de suicidio mediante ingesta de medicamentos presenta un claro predominio en el sexo femenino y una distribución estacional acorde con lo descrito en la literatura
- La mayoría de los casos corresponden a cuadros leves, con bajo riesgo vital
- Se observa una tendencia al aumento progresivo en el N° de casos anuales.