

RESUMEN XXXV CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

Circuncisión con sutura continua en pacientes con epidermolisis bulosa.

Dr. Patricio Herrera*, E.U. M^a José Gana**.

* Cirugía Pediátrica, UGCN, Hospital Padre Hurtado, Clínica Alemana de Santiago, ** Fundación DEBRA.

Propósito: Comunicar los resultados que hemos obtenido con esta técnica en pacientes portadores de EB.

Método: Recolección de información de fichas clínicas más entrevista telefónica diferida a pacientes con diagnóstico de EB más fimosis, en los que se practicó circuncisión, practicando sutura continua de Catgut simple 5-0 a la unión muco-cutánea coronal por mitades operados entre marzo 2007 y abril 2008 en nuestra unidad.

Resultados: 1 paciente presentó un sangrado menor, de la zona del frenillo, motivando una noche de observación hospitalizado, sin necesitar re-intervención (12,5%). No hubo infección, recidiva ni estenosis meatales en los pacientes de esta comunicación. Los 8 pacientes tuvieron un resultado cosmético excelente. No hubo complicaciones cutáneas en zona genital atribuibles a EB ni a la técnica usada.

Comentario: La epidermolisis bulosa es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio. Como tal produce desconfianza en los médicos que se enfrentan ocasionalmente a estos pacientes. Usando la misma técnica que en pacientes sanos, con mínimas modificaciones y el apoyo del equipo DEBRA los resultados fueron excelentes.