

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

**TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO DE VÓLVULO GÁSTRICO
INTERMITENTE EN NEONATO DE BAJO PESO: REPORTE DE UN CASO**

Autores: Scherl, Humberto; Isaguirre, Jorge; Ysetta, Sonia; Siccardi, Alejandra; Birbaum, Sergio
Hospital Italiano de Mendoza
Mendoza, Argentina

Introducción: El vólvulo gástrico es una patología infrecuente en niños. Se informa un caso neonatal de vólvulo gástrico y su tratamiento mínimamente invasivo.

Caso Clínico: Neonato de 28 días de vida con peso al nacimiento de 1.100 g y al momento de la cirugía 1.060 g. Presentó enfermedad de la membrana hialina por lo que requirió surfactante pulmonar. A partir del día 15 de vida se intenta alimentar por sonda orogástrica presentando residuo gástrico y en algunas oportunidades descompensación hemodinámica con residuo porráceo, nunca bilioso. Se diagnosticó vólvulo gástrico organoaxial intermitente mediante seriada esófago-gastro-duodenal y a los 29 días de vida, se realizó como tratamiento gastrostomía endoscópica percutánea. El niño evolucionó favorablemente.

Conclusión: Se ha revisado la literatura no encontrando esta modalidad de tratamiento para neonatos de bajo peso con vólvulo gástrico. La evolución favorable de este caso sugiere que esta modalidad de tratamiento sería una opción razonable para pacientes de alta riesgo, como el caso descrito.