RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

DIVERTÍCULO DE MECKEL COMPLICADO. RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA VIDEOASISTIDA

Autores: Verdugo, R.; Mauret, E.; Reyes, M.
Unidad de cirugía infantil, Hospital Regional de Coyhaique. Décimo primera región, Patagonia Chilena.
Coyhaique, Chile

Resumen: Se presenta caso clínico de preescolar de dos años ocho meses previamente sano, que consulta en servicio de emergencia por presentar durante el mismo día tres episodios de sangramiento rectal abundante, con compromiso hemodinámico y anemia severa (Hcto 18 % y Hb 6, 6 mg%). Además del manejo hemodinámico intensivo se realizó Radiografía de abdomen simple, endoscopía digestiva alta, ecotomografía abdominal, resultando todos normales. La colonoscopía mostró sangre antigua pero sin lesiones. Dado diagnóstico de hemorragia digestiva baja se planteo como causa un Divertículo de Meckel, por lo que se solicito evaluación por cirujano pediatra. Se planificó abordaje quirúrgico mediante laparoscopia diagnóstica, la cual confirmó la existencia de divertículo complicado de ocho cms. de longitud, con signos de sangramiento reciente, en ileón distal, a cuarenta cms. de la válvula ileocecal. Se decidió exteriorizar el asa intestinal por el ombligo y realizar en forma extracorpórea la resección de la lesión y anastomosis termino terminal. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, con realimentación al quinto día y alta al octavo, con recuperación adecuada de su estado general. El divertículo de Meckel es una anomalía congénita, consistente en un remanente sacular del conducto onfalomesentérico. Está presente en el 2% de la población general. A su vez el 2% de ellos sufre una complicación, siendo la más frecuente el sangramiento. El caso presentado permite demostrar que en lugares geográficos apartados, en los cuales no se cuenta con recursos diagnósticos complejos es posible utilizar la laparoscopia como recurso diagnóstico y eventualmente terapéutico. En nuestro caso preferimos exteriorizar el divertículo a través del ombligo para su resección, lo que posibilitó un excelente resultado estético.