RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

TORSIÓN DE EPIPLÓN: REPORTE DE UN CASO

Autores: Anaya Domínguez M.G., *Anaya Gutiérrez J*.

*Cirujano Pediatra, Hospital Harry Williams
Cochabamba, Bolivia

Introducción: La torsión de epiplón es una condición en la que el órgano se tuerce a lo largo de su eje de modo que la vascularidad es afectada. Esta puede ser primaria o secundaria. La torsión primaria un segmento móvil del omento se rota alrededor de un punto fijo en ausencia de patología intrabdominal. Sin embargo la causa precisa es desconocida.

Presentamos el caso por ser una patología poco frecuente, pero que debe considerarse como diagnóstico diferencial en pacientes con abdomen agudo.

Caso: Paciente de 14 años de edad consulta por dolor abdominal tipo pungitivo en fosa iliaca izquierda que se irradia a hemiabdomen derecha al movimiento, acompañado de nauseas sin llegar al vómito, disminución del apetito, constipación desde hace 1 mes. Antecedente de apendicectomía 1 año atrás. Evaluado por ginecología sugiere Enfermedad inflamatoria Pélvica y quiste de ovario. Hemograma discreta neutrofilia. Ecografía reporta: imagen heterogénea de 8x4 cm, en parte alta anexo izquierdo, separada del ovario normal. Sugiere gestación ectópica. Fracción Beta negativa, Se realiza laparotomía exploradora hallándose liquido libre hemorrágico en cavidad, masa firme de 10x 8 cm solidoquística dependiente de epiplón mayor que es reseca en su totalidad, adenopatías mesentéricas cuyo reporte histopatológico es compatible con linfadenitis crónica reactiva secundaria. La patología de la masa informa: hematoma en organización, paniculitis piogénica con reacción granulomatosa a cuerpo extraño. Evolución postoperatoria satisfactoria, sin problemas actualmente. Seguimiento por 6 meses.