

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

TRICOBEOZAR GÁSTRICO PEDIÁTRICO: REPORTE CASO CLÍNICO

Autores: Acevedo Carlos, Acuña Renato, Toro Maritza
Hospital de Carabineros
Santiago, Chile

Resumen: Los tricobezoares gástricos son ovillos de folículos pilosos que se coleccionan en los pliegues mucosos del estómago y crecen enormemente. Como ocurre desnaturalización de las proteínas del pelo, estos son de color negro-café y de muy mal olor. En el 90% de los casos ocurren en mujeres jóvenes asociados a tricotilomanía y tricotofagia, debido a desordenes nerviosos y alimentarios (bulimia). Ocurre en 1 de cada 2000 niños. Siendo sus complicaciones más importantes: hemorragia digestiva, perforación gástrica, obstrucción intestinal, etc. Se presenta caso clínico de paciente femenino, 11 años de edad, en control hace 1 año en psiquiatría por tricotilomanía y tricotofagia, derivada a gastroenterología infantil se constata anorexia y masa abdominal en epigastrio e hipocondrio izquierdo. Se realizan estudios tomográficos y baritados, siendo derivada al servicio de cirugía infantil para resolución de tricobezoar gástrico. Se interviene quirúrgicamente en forma exitosa en diciembre de 2008. Se adjuntan imágenes de estudios abdominales simples, baritados, tomográficos y secuencia de la cirugía. Dada de alta en excelentes condiciones, control mensual sin problema desde el punto de vista quirúrgico y psiquiátrico.