

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

**TUMORES EXOFÍTICOS DE REGIÓN PERIANAL EN PEDIATRÍA.
PRESENTACIÓN DE 4 CASOS CLÍNICOS.**

Autores: Bollini R*, Pollono D**, Drut R ***, Pollono A****, López M*****

*Cirujano Infantil, Hospital de Olavarría, **Jefe de Oncología HIAEP La Plata, ***Jefe de Patología HIAEP La Plata, ****Oncohematóloga Htal Garrahan, *****Pediatra Hospital de Niños Azul Olavarría, República Argentina

Introducción: Los tumores perineales exofíticos son infrecuentes en pediatría. Los más frecuentes son: El teratoma sacrococcígeo en neonatos y en lactantes y sarcomas pélvicos en niños mayores.

Presentación de casos: Caso 1: niña, 2 meses. Presenta formaciones perianales. Tratamiento: exéresis con láser. Anatomopatología: rhabdomyosarcoma embrionario. Postoperatorio (PO) favorable. Estadío I Ausencia de metástasis. Inició quimioterapia: protocolo SIOP (MMT95) actinomicina (ActD), ifosfamida (IFO) y vincristina (VCR) 6 meses. Sin recidiva.

Caso 2: niño recién nacido: ano imperforado, hipospadía, escroto bífido y tumoración perineal. Conducta: colostomía sigmoidea y punción aspiración con aguja fina (PAAF) tumoral, confirmando teratoma inmaduro. Tratamiento: exéresis tumoral (TC toracoabdominal, MO y CO negativos). Recidiva local en 8 meses; PAAF: tumor de seno endodérmico (TSE).

Alfa Feto Proteína (AFP) 1045 ng/ml. Tratamiento: protocolo SIOP vinblastina – bleomicina – cisplatino (CDDP) 6 ciclos; remisión completa.

Caso 3: Niña 2 ½ años. Ingreso: presunto maltrato, hematoma en región glútea, hipotonía de esfínter anal y miembros inferiores. TC: tumor sacro y canal medular +, metástasis pulmonar; AFP 17000ng/ml. PAAF: TSE. Tratamiento: Etopósido- IFO-CDDP 6 ciclos; exéresis del residuo y autotrasplante de médula ósea (ATMO). Sin recidiva.

Caso 4: Niña 4 años, tumor interglúteo, de 3 x 4 cm. Exéresis quirúrgica, Anatomopatología: sarcoma de Ewing extraesquelético. Estadificación negativa. Estadío I. Quimioterapia: protocolo SIOP (MMT05) actD-VCR. Sin recidiva.

Revisión: Los tumores exofíticos malignos de región perianal son infrecuentes (2% en sarcomas), no hay descrito Ewing extraóseos perineales. 79% de los teratomas tienen localización sacrococcígea. Las metástasis y recidivas tienen alta sobrevida con quimioterapia y ATMO.