Revista Pediatría Electrónica

Universidad de Chile Facultad de Medicina Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Servicio Salud Metropolitano Norte Hospital Clínico de Niños Roberto Del Río

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

LESIÓN GRAVE DE VÍA AEREA SUPERIOR POR ATAQUE CANINO

Autores: Ninamango, L.E; Braverman, R.I; Romero, S.M; Henain, S.B

Hospital Pediátrico "Juan Pablo II"

Corrientes, Argentina

Resúmen: El perro comparte el hábitat del hombre desde hace más de 12.000 años, y sigue siendo la máscota más popular. La convivencia, habitualmente beneficiosa para ambos, tiene su lado negativo en las zoonosis y las lesiones producidas por perros, principalmente mordeduras. Estas últimas constituyen un importante problema de salud, por los costos que implican a las comúnidades, y por las secuelas físicas y emocionales que ocasionan en las víctimás. Muchos son los estudios que reportan casos y analizan estadisticas sobre el tema, arrojando datos y conclusiones diferentes muchas veces, lo que si parece estar claro es que los niños son las víctimás más vulnerables y muchas veces sufren heridas multiples por lo cual se debe prestar atención a todas ellas, sus características, ubicación y tratarlas con la urgencia que se merecen. El caso que reportamos en ésta oporunidad, de los cientos que antendemos por año en nuestro nosocomio, es el de un niño de 2 años que sufrió el ataque de un canino de más de 30 kg (factor de riesgo para heridas graves)que le produjo multiples heridas en cabeza, tronco y miembros y una herida en cuello que a simple vista parecía una más pero la ubicación y la dificultad respiratoria moderada que acompañaba el cuadro alertaron a la intubación orotraqueal por sospechs de lesion de vía aerea superior que luego se corroboró el quirofano, donde se procedio a la sutura de todas las heridas incluyendo una que afectaba la cara anterior de la traquea en el tercio medio del cuello que se suturó con puntos separados de material irreabsorvible. El paciente permaneció intubado 48 horas, se extubó luego sin inconvenientes y evolucionó en forma favorable, sindo dado de alta al cuarto día. Reportamos de ésta manera un caso más de ataque canino a niños produciendole heridas multiples y potencialmente fatales.