RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

Linfangioma Abdominal Complicado : Reporte de un caso

Autores: Drs. Díaz A., Ibáñez R., Valenzuela M., Garrido M.
Servicio Cirugía Hospital de Niños Roberto del Río
Santiago, Chile

Introducción: Los Linfangiomas abdominales, son una rara malformación congénita de los vasos linfáticos, se encuentran predominantemente en la infancia y en el sexo masculino.

Descripción: Paciente de 3 años, sexo femenino, con antecedentes de Linfangioma abdominal diagnosticado a los 9 meses, por hallazgo incidental ecográfico complementario a estudio de Pielonefritis aguda. Evoluciona sin complicaciones, con controles ecográficos seriados, posponiéndose resolución quirúrgica por decisión de sus padres. Consulta en servicio de Urgencia Hospital Roberto del Río el día 02-05-2009 por cuadro caracterizado por dolor abdominal de 3 días de evolución en fosa iliaca derecha, intermitente. Aumento del perímetro abdominal y disnea de esfuerzo en la última semana. FC 157, Presión arterial 115/61mmHg, Saturación 94%. Piel y mucosas pálidas, examen cardiopulmonar normal, Abdomen: globuloso, doloroso a la palpación en fosa iliaca derecha y zona periumbilical. Dentro de los exámenes complementarios destaca: Hematocrito 13%, Hemoglobina 3,5 mg/dl, Protrombina 86%. Tomografía abdominal y angiografía compatible con masa tumoral abdominal de 23x16 cm con contenido anecoico. Se decide Laparotomía exploradora 04-05-2009, previa estabilización de paciente. Como hallazgo intraoperatorio se encuentra Linfangioma gigante dependiente de Epiplón mayor, con desplazamiento de asas intestinales a derecha, contenido hemorrágico antiguo de aproximadamente 3 litros. Se realiza linfangectomía total. En el post operatorio se completa corrección de anemia, se realimenta precozmente, sin complicaciones. Alta al 5to día de hospitalización. Control ambulatorio por especialidad a los 7 días.

Conclusiones: En este caso destaca la ubicación infrecuente de esta malformación vascular. El manejo y la resolución quirúrgica determinaron una rápida recuperación, con una estadía hospitalaria corta.