

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

MELANOMA MALIGNO CON GANGLIO CENTINELA POSITIVO

Autores: Contreras R, Lopetegui S.
Hospital de Niños Roberto del Río
Santiago, Chile

Introducción: Patología de baja frecuencia en edad pediátrica, pero de gran importancia, dada el pronóstico sombrío a que están expuestos estos pacientes. Su etapificación y pronóstico dependen de niveles anatómicos de invasión (Clark) y del espesor de su profundidad (Breslow).

Descripción del caso: Presentamos el caso de un preescolar de 2 años, portador de Melanoma Maligno de pie derecho, intervenido en otro centro hospitalario, con márgenes positivos en profundidad, sin posibilidad de establecer niveles anatómicos, ni de profundidad en la lesión.

En segunda revisión se amplía el borde de sección quirúrgica y se realiza búsqueda de ganglio centinela, con un detector de radioisótopos en forma intrao-peratoria. Se logra confirmar compromiso metastásico ganglionar de hueso poplíteo. Sin compromiso ganglionar a nivel inguinal. Ingres a Quimioterapia (QMT) en la que se encuentra actualmente.

Revisión del tema: Descubrir el compromiso metastásico ganglionar de este paciente, nos confirmó la necesidad de iniciar QMT agresiva y discutir con sus familiares gravedad de su enfermedad. La literatura internacional describe un comportamiento similar al del adulto y en algunos casos más agresivo aun en niños.