RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

APORTACIÓN AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y MANEJO DE UNA FISURA LABIAL MEDIA

Autores: Parri F.J., Coloma R., Lerena J., Corradini M., Nuñez B.
Hospital Sant Joan de Déu-Clínic. Universitat de Barcelona
Barcelona, España

Resumen: La fisura labial media es una malformación facial muy poco frecuente (1/10000 RN). Incluso para las unidades especializadas en fisurados el manejo de este tipo de pacientes es de excepción.

Caso Clínico: Varón afecto de fisura labial central completa con ausencia de premaxila y columela, RNM cerebral normal. Tratamiento: Primer tiempo: a los 11 meses de vida. Intubación nasotraqueal con fibroscopio, bajo anestesia general se realiza colgajo vascularizado de labio inferior tipo Abbe modificado, con prolongación para reconstruir la columela. No se practicó traqueostomía. Además se realiza fijación intermaxilar con tornillos transmucosos y bandas elásticas. Extubación a las 48 horas. Permanece ingresado durante 15 días en la unidad de cuidados intermedios, con presencia permanente de los padres y alimentación enteral con sonda nasogástrica. Segundo tiempo: sección del pedículo bajo sedación y anestesia local.

Comentario: El escaso número de casos con esta malformación no permite adquirir experiencia suficiente por lo que es muy importante comunicar la propia. En nuestro caso han sido positivas una pequeña modificación en el diseño, y el manejo médico sin traqueostomía, pero con vigilancia intensiva. No hemos encontrado utilidad a la fijación intermaxilar.

El paciente seguirá correcciones sucesivas de su labio, nariz y tercio medio facial.