RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

REVISIÓN DE EXPLORACIONES LAPAROSCÓPICAS EN TESTÍCULOS NO PALPABLES EN HOSPITAL DE SAN CARLOS CHILE

Autores: Drs. Flores S, Santos M, Ramírez R, Al. Canales F, Jara F.
Servicio de Cirugía Infantil Hospital San Carlos
San Carlos, Chile

Introducción: La laparoscopia se describió por primera vez en la exploración de testículo no palpable en 1976, Actualmente es la técnica de elección en el diagnóstico y tratamiento de ésta patología. El objetivo de éste trabajo es revisar nuestra experiencia con ésta técnica y analizar los resultados.

Material y Método: Estudio retrospectivo, de fichas de pacientes con diagnóstico de testículo no palpable en el Hospital de San Carlos entre los años 2001 y 2008, se analizaron un total de 21 fichas de pacientes con diagnóstico de testículo palpable unilateral o bilateral se consignó edad, diagnóstico, hallazgos operatorios, tipo de cirugía abierta o laparoscópica y seguimiento.

Resultados: La edad promedio de cirugía fue 6 años, el menor de 3 años y el mayor de 13 años, el 52.4 % se localizaron intraabdominales, 14.3% resultaron testes evanescentes y en 33, 3% se localizaron en conducto inguinal.

En los pacientes en que se encontraron testes intraabdominales se realizó 1º tiempo de fowler Stephens y con promedio de 10 mese se realizó la 2ºcirugía encontrando solo un teste atrófico en un paciente con bilateralidad, el porcentaje de éxito fue de 90.9 %, no se registraron complicaciones postoperatorias.

Conclusiones: En ésta revisión la cantidad de exploraciones en que ese encontró testículos intraabdominales es similar a otras series, así como la cantidad de testes evanescentes el porcentaje de éxito fue más de un 90%, confirmando que en la presencia de testes no palpables la exploración laparoscópica por un puerto umbilical, permite realizar un diagnóstico certero y a la vez realizar el primer tiempo del de fowler-stephens es una técnica segura y con bajo índice de complicaciones.