

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

PERFORACIÓN GASTROINTESTINAL EN RECIÉN NACIDOS ANÁLISIS DE 25 CASOS

Autores: Arauz, M; Urquidi, M; Acevedo, J; Ismael, M
Caja Nacional de Salud
Cochabamba, Bolivia

Resumen: Fue realizado un estudio retrospectivo de recién nacidos con diagnóstico de perforación intestinal, internados en el período de agosto 1998 a diciembre de 2008 en el Hospital # 2 de la Caja Nacional de Salud, Cochabamba, Bolivia. La edad media fue de 3, 3 días. Hubo predominio del sexo masculino y de raza blanca. La mayoría tuvo algún tipo de estrés perinatal 68%. La distensión abdominal ocurre en 96% de los casos acompañada de disturbios respiratorios y vómitos. Las perforaciones ocurrieron en la primera semana de vida en 96% de los casos, siendo 48% en el primer día. El intestino delgado fue el órgano más dañado (43, 7%) dentro de los casos cuya perforación fue identificada en la laparotomía. El tratamiento quirúrgico fue realizado en todos los casos. La mortalidad global fue de 52% siempre asociada a septicemia. La mayor mortalidad estuvo asociada a perforación gástrica. Actualmente la perforación gastrointestinal ha sido relacionada con más de una presentación clínica de enterocolitis necrotizante y su etiología probablemente es multifactorial.