

**RESUMENES XLIX JORNADAS DE INVESTIGACION PEDIATRICA**

**DEPRESIÓN Y CONDUCTA ALIMENTARIA**

Barriga Carvajal Lautaro, Figueroa Edwards Dominga

**Introducción:** En esta investigación se busca conocer si existe predisposición a presentar cuadros de anorexia y bulimia nerviosa en adolescentes con patología psiquiátrica, específicamente en pacientes con cuadros depresivos con y sin intentos de suicidio

**Material y método:** Se aplica el test de actitudes alimentarias (EAT-26) a 61 pacientes (80% mujeres y 20% hombres), desglosándose en 31 pacientes que habían sido diagnosticados según el CIE-10, como depresivos con intentos de suicidio y 30 pacientes depresivos sin intento de suicidio, cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 17 años. Durante la aplicación del test, todos los pacientes se encontraban en tratamiento en el Hospital.

**Resultados:** Los resultados mostraron que las mujeres adolescentes depresivas con intentos de suicidio presentan mayor correlación significativa al 0,01, con indicadores del test que dicen relación con preocupación por estar delgadas, por su figura corporal, por los alimentos que engordan y predisposición a presentar trastornos alimentarios, específicamente bulimia.

**Conclusiones:** Se puede concluir que la depresión con intentos de suicidio en adolescentes mujeres, puede ser un factor que podría favorecer el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) orientado principalmente a Bulimia, elemento a considerar. Por lo tanto, se hace necesario explorar en pacientes con estas características no solo los elementos depresivos, sino también los criterios de TCA como distorsión en su imagen corporal, miedo intenso a engordar, entre otros, con el objeto de abordarlos en la psicoterapia.