

## RESUMENES LII JORNADAS DE INVESTIGACION PEDIATRICA SANTIAGO NORTE

<b>Título</b>
<b>QUISTES SUBGLÓTICOS ADQUIRIDOS: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA</b>
<b>Autores/Filiación</b>
Cristóbal Chávez S <sup>1</sup> , Lara Ricci L <sup>2</sup> , Andrés Alvo V <sup>1</sup> <sup>1</sup> Médico del Departamento de Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universidad de Chile. <sup>2</sup> Interna de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
<b>Antecedentes</b>
Los quistes subglóticos adquiridos se deben sospechar en pacientes con estridor bifásico y antecedente de prematuridad e intubación orotraqueal. El tratamiento cuando son sintomáticos es quirúrgico mediante marsupialización transoral.
<b>Objetivo</b>
Presentar 2 casos clínicos con revisión de la literatura
<b>Métodos</b>
Revisión de fichas clínicas de 2 pacientes del hospital Roberto del Río
<b>Resultados</b>
Presentamos dos casos de pacientes prematuros de 28 y 30 semanas con antecedente de ventilación mecánica invasiva en el periodo neonatal en contexto de enfermedad de membrana hialina, que, en los meses posteriores a la extubación, evolucionaron con estridor bifásico progresivo y dificultad respiratoria. En ambos casos se realizó revisión de vía aérea en pabellón diagnosticándose quistes subglóticos confirmado mediante biopsia diferida. Se realiza resección con técnica fría evolucionando favorablemente y sin recidiva posterior.
<b>Conclusiones</b>
Los quistes subglóticos adquiridos deben ser considerados en el diagnóstico diferencial de estridor del lactante ante antecedente de prematuridad e intubación orotraqueal. En estos pacientes la laringoscopia directa es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. El seguimiento de estos pacientes es importante dada su alta recurrencia, especialmente dentro de los primeros meses.